

L'implant contraceptif

Le principe

L'implant contraceptif libère régulièrement une hormone qui bloque l'ovulation. De plus, l'implant entraîne une modification de la glaire cervicale qui gêne l'avancée des spermatozoïdes.

La présentation

Il s'agit d'un bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et 2 mm de diamètre.

L'utilisation

L'implant contraceptif est placé sous la peau, sur la face interne du bras, par un médecin. Cette intervention simple ne nécessite qu'une anesthésie locale et ne dure que quelques minutes. Une fois implanté, il est efficace trois ans. L'implant peut être retiré, par un médecin, dès que la femme le désire.

La réversibilité

Dès son retrait, il n'a plus d'effet.

Les précisions utiles

- L'implant peut provoquer des effets indésirables comparables à ceux de la pilule : troubles de la régularité et de l'abondance des règles, saignements intermenstruels.
- L'implant n'est pas recommandé comme première contraception, sauf pour les femmes présentant une contre-indication ou une intolérance à la pilule et au stérilet.

La protection contre le Sida et les MST

L'implant contraceptif ne protège pas contre les Maladies Sexuellement Transmissibles ou le Sida. Seuls les préservatifs masculin ou féminin protègent des MST. Il faut les utiliser en plus de l'implant.

L'efficacité

L'implant contraceptif est efficace à 99 %.

La disponibilité

L'implant est délivré en pharmacie, sur prescription médicale. Il faut donc consulter un médecin.

Le prix

L'implant coûte environ 138 €. Il est remboursé à 65 %.